

PREPARAZIONE DA ESEGUIRE PRIMA DI SOTTOPORSI AD UN ESAME
TAC CON MEZZO DI CONTRASTO.

4 GIORNI PRIMA DELL'ESAME	<ul style="list-style-type: none"> • Zirtec 10mg una compressa <u>LA SERA</u> • Antra una compressa <u>LA SERA</u>
3 GIORNI PRIMA DELL'ESAME	<ul style="list-style-type: none"> • Zirtec 10mg una compressa <u>LA SERA</u> • Antra una compressa <u>LA SERA</u>
2 GIORNI PRIMA DELL'ESAME	<ul style="list-style-type: none"> • Zirtec 10mg una compressa <u>LA SERA</u> • Antra una compressa <u>LA SERA</u> • Bentelam 1fl. 4 mg. <u>LA SERA</u>
GIORNO DELL'ESAME	<ul style="list-style-type: none"> • Bentelan 4 mg.1 fl. • Zirtec 10mg una compressa

ATTENZIONE

In caso di soggetti diabetici in trattamento farmacologico con ipoglicemizzanti o insulina, contattare l'anestesista della clinica prima sottoporsi all'esame.
In questo caso NON prendere Bentelan, ma solo Antra e Zirtec.

Esibire sempre precedenti esami (Ecografie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali lettere di dimissione o referti di visite specialistiche attinenti alla propria patologia.

Portare i seguenti esami fatti non più di DUE MESI FA

- Emocromo azotemica glicemia creatine mia
- Elettrocardiogramma